

A mágneses impulzus tér stimuláció lehetőségei fogászati pszichoszomatikus manifesztációk iniciális terápiájában

Fábián Tibor Károly, Szabó Zsuzsanna, Fejérdy Pál, Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani
Klinika, Budapest

Bevezetés: A száj arc régióra lokalizálódó pszichoszomatikus manifesztációk iniciális terápiája legtöbbször a fogorvos feladata. Ehhez a fogorvosi betegellátás keretei között biztonságosan alkalmazható, és a tüneti terápia szempontjából hatékony módszerekre van szükség. **Anyag és módszer:** Az alacsony indukció értékű mágneses impulzus tér stimuláció hatékonyságát vizsgáltuk 8 páciens esetében (2 ffi, 8 nő, életkor: 41-71 év). A betegek pszichiátriai alapbetegségének BNO-10 kategóriái: F30-F39 (4 fő), F40-F48 (3 fő), F00-F09 (1 fő). A vezető tünet minden esetben a fájdalom volt. A kezeléseket hetente egyszer, maximum 10 alkalommal végeztük, Viofor JSP classic készülék alkalmazásával. A stimulációt ellipszis applikátor segítségével végeztük, M2-P2 beállítás mellett, 4-es intenzitással. A tüneti javulást numerikus analóg skála segítségével és a betegek szóbeli közlése alapján mértük. **Eredmények:** A kezeléseket követően 6 esetben (75%) találtunk jól érzékelhető, jelentős javulást, 1 esetben (12,5%) a tünet nem változott, 1 esetben (12,5%) pedig rosszabbodott. **Következtetések:** Eredményeink arra utalnak, hogy az alacsony indukció értékű mágneses impulzus tér stimuláció megfelelő indikáció esetén eredményesen alkalmazható a fogászati pszichoszomatikus manifesztációk iniciális terápiájában.